

RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AU PATIENT

LISEZ CE DOCUMENT POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT

CAPVAXIVE®

Vaccin antipneumococcique 21-valent conjugué

Lisez ce qui suit attentivement avant de recevoir **CAPVAXIVE®**. L'information présentée ici est un résumé et ne couvre pas tout ce qui a trait à ce vaccin. Discutez de votre état de santé et de votre traitement avec votre professionnel de la santé et demandez-lui s'il possède de nouveaux renseignements au sujet de **CAPVAXIVE®**.

Pour quoi utilise-t-on CAPVAXIVE®?

- **CAPVAXIVE®** est un vaccin utilisé chez les adultes âgés de 18 ans ou plus qui contribue à protéger contre les pneumocoques invasives (sévères) causées par des bactéries appelées pneumocoques. Ces bactéries peuvent causer diverses maladies, qui peuvent être invasives (sévères), telles que :
 - une infection des poumons (appelée pneumonie bactériémique);
 - une infection de la zone entourant le cerveau et la moelle épinière (appelée méningite);
 - une infection du sang (appelée bactériémie).

Ces maladies sont plus fréquentes chez les personnes âgées ou qui présentent des problèmes de santé (tels que le diabète; des problèmes touchant le cœur, le foie ou les poumons, y compris l'asthme; le tabagisme; l'alcoolisme).

Comment CAPVAXIVE® agit-il?

Le vaccin agit en aidant votre corps à fabriquer ses propres anticorps, qui peuvent ensuite vous protéger contre les pneumocoques causées par les types de pneumocoques couverts par le vaccin.

Quels sont les ingrédients de CAPVAXIVE®?

Ingrédients médicinaux : sucres bactériens provenant de 21 types de pneumocoques, chacun lié à une protéine (CRM197) constituant l'ingrédient actif. Les sucres issus de ces bactéries et la protéine ne sont pas vivants et ne causent pas de maladie.

Ingrédients non médicinaux : chlorure de sodium, eau, L-histidine, polysorbate 20. **CAPVAXIVE®** ne contient aucun agent de conservation.

CAPVAXIVE® est disponible sous les formes posologiques suivantes :

- Seringues préremplies (0,5 mL)

Ne pas utiliser CAPVAXIVE® si :

- vous êtes allergique à l'un des ingrédients de **CAPVAXIVE®** notamment l'anatoxine diphtérique.

Consultez votre professionnel de la santé avant de recevoir CAPVAXIVE®, afin de réduire la possibilité d'effets indésirables et assurer la bonne utilisation du médicament. Mentionnez à votre professionnel de la santé tous vos problèmes de santé, notamment :

- toute allergie;

- un système immunitaire affaibli (cela signifie que votre corps a de la difficulté à combattre les infections);
- la prise de certains médicaments ou traitements susceptibles d'affaiblir votre système immunitaire;
- des problèmes de saignements ou une tendance aux ecchymoses (bleus).

Indiquez à votre professionnel de la santé si vous :

- êtes enceinte ou prévoyez le devenir. Votre professionnel de la santé vous dira si vous devriez recevoir CAPVAXIVE®
- allaitez ou prévoyez le faire. Votre professionnel de la santé vous dira si vous devriez recevoir CAPVAXIVE®.

Autres mises en garde :

Comme pour tout autre vaccin, CAPVAXIVE® peut ne pas conférer une protection complète à toutes les personnes qui le reçoivent.

CAPVAXIVE® n'a pas été étudié chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans.

Utilisation de CAPVAXIVE® avec d'autres vaccins et médicaments

Mentionnez à votre professionnel de la santé toute la médication que vous prenez, y compris les médicaments, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou les produits de médecine douce.

CAPVAXIVE® peut être administré en même temps que le vaccin antigrippal (inactivé).

Comment CAPVAXIVE® est-il administré?

- CAPVAXIVE® est administré sous forme d'injection dans le muscle.

Dose habituelle :

Les adultes doivent recevoir une seule dose du vaccin.

Surdosage :

Un surdosage de CAPVAXIVE® est peu probable du fait de sa présentation dans une seringue à dose unique préremplie.

Si vous pensez que vous ou une personne dont vous vous occupez avez reçu trop de CAPVAXIVE®, contactez immédiatement un professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou votre centre antipoison régional, même en l'absence de symptômes.

Dose oubliée :

CAPVAXIVE® est un vaccin à dose unique.

Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à CAPVAXIVE®?

Comme tout autre vaccin, CAPVAXIVE® peut causer des effets secondaires, bien que ceux-ci ne surviennent pas chez tous les patients.

Les effets secondaires observés avec CAPVAXIVE® comprennent les suivants :

Fréquents – susceptibles de survenir chez plus de 1 sujet sur 10 :

- douleur, rougeur ou enflure au point d'injection;
- sensation de fatigue;
- maux de tête;
- muscles endoloris.

Peu fréquents – susceptibles de survenir chez plus de 1 sujet sur 100 et jusqu'à 1 sur 10 :

- fièvre.

Rares – susceptibles de survenir chez plus de 1 sujet sur 1 000 et jusqu'à 1 sur 100 :

- diarrhée, nausées;
- démangeaisons au point d'injection;
- enflure des glandes du cou, des aisselles ou de l'aîne;
- frissons;
- étourdissements.

Ces effets secondaires sont généralement légers et de courte durée.

Si vous présentez un ou plusieurs des effets secondaires mentionnés ci-dessus ou des symptômes inhabituels après avoir reçu CAPVAXIVE®, parlez-en à votre professionnel de la santé. Obtenez immédiatement une aide médicale si vous avez des symptômes d'une réaction allergique, notamment les suivants :

- respiration sifflante ou difficulté à respirer;
- enflure du visage, des lèvres ou de la langue;
- urticaire;
- éruption cutanée.

Voilà certains des effets secondaires que vous pourriez ressentir lorsque vous recevez CAPVAXIVE®. Certains effets secondaires peuvent ne pas être énumérés dans le présent document. Adressez-vous à votre professionnel de la santé pour obtenir des renseignements complémentaires.

En cas de symptôme ou d'effet secondaire gênant non mentionné dans le présent document ou d'aggravation d'un symptôme ou d'effet secondaire vous empêchant de vaquer à vos occupations quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.

Déclaration des effets secondaires soupçonnés des vaccins

Pour le grand public : Si vous ressentez un effet secondaire à la suite d'une vaccination, veuillez le signaler à votre professionnel de la santé.

Si vous souhaitez obtenir des informations sur l'atténuation des effets secondaires, veuillez contacter votre professionnel de la santé. L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC), Santé Canada et Merck Canada Inc. ne peuvent pas fournir de conseils médicaux.

- **Pour les professionnels de la santé :** Si un patient ressent un effet secondaire à la suite d'une vaccination, veuillez remplir le formulaire approprié de rapport des effets secondaires suivant l'immunisation (ESSI) selon votre province ou territoire (<https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/declaration-manifestations-cliniques-inhabituelles-suite-immunisation/formulaire.html>) et l'envoyer à votre unité de santé locale.

Entreposage :

Conserver le vaccin au réfrigérateur à une température de 2 °C à 8 °C. Ne pas congeler. Protéger de la lumière.

Garder hors de la portée et de la vue des enfants.

Pour en savoir plus sur CAPVAXIVE® :

- Communiquer avec votre professionnel de la santé.
- Lire la monographie de produit intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les renseignements destinés aux patients. Ce document est disponible sur le site Web de Santé Canada (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html>), le site Web du fabricant (www.merck.ca), ou peut être obtenu en téléphonant au 1-800-567-2594.

Le présent dépliant a été rédigé par Merck Canada Inc.

Dernière révision : 15 juillet 2024

CAPVAXIVE® est une marque déposée de Merck Sharp & Dohme B.V., utilisée sous licence.

® Merck Sharp & Dohme LLC, utilisées sous licence.

* Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif.

© 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, É.-U. et ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.