

RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX PATIENTS

LISEZ CE DOCUMENT POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT

PREVYMIS®

comprimés de létermovir
létermovir pour injection

Lisez ce qui suit attentivement avant de prendre **PREVYMIS®** et lors de chaque renouvellement de prescription. L'information présentée ici est un résumé et ne couvre pas tout ce qui a trait à ce médicament. Discutez de votre état de santé et de votre traitement avec votre professionnel de la santé et demandez-lui s'il possède de nouveaux renseignements au sujet de **PREVYMIS®**.

Pour quoi utilise-t-on PREVYMIS®?

PREVYMIS® est un médicament d'ordonnance qui aide à empêcher les adultes de 18 ans et plus de tomber malades suite à un CMV (cytomégalovirus). Le CMV est un virus. Chez la majorité des gens, le CMV ne cause pas d'effets nuisibles. Toutefois, si votre système immunitaire est affaibli après une greffe de cellules souches (moelle osseuse) ou une greffe de rein, vous pourriez présenter un risque élevé d'être malade en raison du CMV.

Comment PREVYMIS® agit-il?

PREVYMIS® est un médicament antiviral. Il empêche le CMV de se multiplier.

Quels sont les ingrédients de PREVYMIS®?

Ingrédient médicinal : létermovir

Ingrédients non médicinaux :

Comprimés : cellulose microcristalline, croscarmellose sodique, dioxyde de silice colloïdal, povidone 25 et stéarate de magnésium.

Les comprimés sont enrobés d'une pellicule contenant les ingrédients inactifs suivants : dioxyde de titane, hypromellose 2910, monohydrate de lactose, oxyde de fer jaune, oxyde de fer rouge (comprimés à 480 mg uniquement) et triacétine. La cire de carnauba est ajoutée comme agent de satinage.

Solution pour injection intraveineuse : chlorure de sodium, eau pour injection, hydroxyde de sodium et hydroxypropylbétadex.

PREVYMIS® est disponible sous les formes posologiques suivantes :

Comprimé : 240 mg et 480 mg.

Solution pour injection : 20 mg/mL. Offerte à 240 mg/12 mL et à 480 mg/24 mL.

Ne pas utiliser PREVYMIS® si :

- vous êtes allergique au létermovir ou à tout autre ingrédient de PREVYMIS®;
- vous prenez l'un des médicaments suivants :
 - le pimozide (pour le traitement du syndrome de Gilles de La Tourette);
 - des alcaloïdes de l'ergot (pour le traitement des migraines).

Si vous prenez **PREVYMIS®** avec de la cyclosporine, ne prenez pas de lovastatine, de rosuvastatine, de simvastatine ou de bosentan.

Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre PREVYMIS®, afin de réduire la possibilité d'effets indésirables et assurer la bonne utilisation du médicament. Mentionnez à votre professionnel de la santé tous vos problèmes de santé, notamment :

- Si vous souffrez d'une maladie des reins.
- Si vous souffrez d'une maladie du foie.
- Si vous êtes enceinte ou essayez de le devenir. On ignore si PREVYMIS® peut être dangereux pour l'enfant que vous portez.
- Si vous allaitez ou avez l'intention d'allaiter. On ignore si PREVYMIS® peut passer dans le lait maternel et être absorbé par le nourrisson.

Mentionnez à votre professionnel de la santé toute la médication que vous prenez, y compris les médicaments, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou les produits de médecine douce.

Les produits suivants pourraient interagir avec PREVYMIS® :

- Si vous prenez l'un de ces médicaments, assurez-vous d'en aviser votre médecin :
 - Alfentanil, fentanyl (pour traiter la douleur intense)
 - Amiodarone (pour traiter les battements de cœur irréguliers)
 - Midazolam (utilisé comme sédatif)
 - Cyclosporine, tacrolimus, sirolimus (pour prévenir les rejets de greffe)
 - Voriconazole (pour traiter les infections fongiques)
 - Statines, comme l'atorvastatine, la fluvastatine, la lovastatine, la pravastatine, la rosuvastatine et la simvastatine (pour abaisser un taux élevé de cholestérol)
 - Oméprazole, pantoprazole (pour traiter les ulcères d'estomac et d'autres troubles d'estomac)
 - Glyburide, répaglinide, rosiglitazone (pour abaisser un taux élevé de sucre dans le sang)
 - Carbamazépine, phénobarbital, phénytoïne (pour traiter l'épilepsie ou les convulsions)
 - Warfarine (pour éclaircir le sang ou pour prévenir les caillots sanguins)
 - Rifabutine, rifampine (pour traiter les infections mycobactériennes)
 - Bosentan (pour abaisser la pression élevée dans les vaisseaux sanguins des poumons)
 - Millepertuis (*Hypericum perforatum*) [produit à base d'herbes médicinales]
 - Éfavirenz, étravirine, névirapine (pour traiter l'infection par le VIH)
 - Modafinil (pour prévenir la somnolence)
- Sachez quels médicaments vous prenez. Conservez une liste de vos médicaments et montrez-la à votre médecin et à votre pharmacien si l'on vous prescrit un nouveau médicament.
- Vous pouvez demander à votre médecin ou à votre pharmacien qu'il vous remette une liste des médicaments qui pourraient interagir avec PREVYMIS®.
- Ne commencez pas à prendre un autre médicament ou ne cessez pas de le prendre sans en avoir d'abord parlé à votre médecin.

Comment prendre PREVYMIS® :

- Vous pouvez recevoir PREVYMIS® de deux manières différentes : sous forme de comprimés ou par voie intraveineuse (IV).
- Il est important de ne pas oublier ou omettre de prendre vos doses de PREVYMIS®.

Dose habituelle :

Si vous prenez les comprimés :

- **Prenez 1 comprimé une fois par jour.**
 - Prenez-le à la même heure tous les jours.
 - Prenez-le avec ou sans nourriture.
 - Avalez le comprimé entier. Ne cassez pas, n'écrasez pas et ne mâchez pas le comprimé.
- Vous devez prendre ce médicament exactement comme vous l'a prescrit votre médecin.
- Gardez-le dans l'emballage d'origine jusqu'à son utilisation.
- Ne cessez pas de prendre PREVYMIS® sans en parler d'abord avec votre médecin.
- Évitez de manquer de PREVYMIS®.

Si vous recevez PREVYMIS® par voie intraveineuse (IV) :

- Vous recevrez PREVYMIS® une fois par jour, sur une période d'environ 1 heure.

Surdosage :

Si vous prenez une plus grande quantité de PREVYMIS® que la dose prescrite, appelez votre médecin immédiatement.

Si vous pensez que vous ou une personne dont vous vous occupez avez pris trop de PREVYMIS®, contactez immédiatement un professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou votre centre antipoison régional, même en l'absence de symptômes.

Dose oubliée :

Si vous oubliez de prendre les comprimés :

Si vous oubliez de prendre votre dose de PREVYMIS®, prenez-la aussitôt que vous vous apercevez de l'oubli. S'il est presque temps de votre prochaine dose, ne prenez pas la dose oubliée et prenez la dose suivante à l'heure prévue.

- Ne prenez pas deux doses de PREVYMIS® en même temps pour compenser une dose oubliée.
- Si vous n'êtes pas sûr de savoir quoi faire, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous recevez PREVYMIS® par voie intraveineuse (IV) :

- Si vous manquez votre rendez-vous, prenez-en un autre immédiatement.

Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à PREVYMIS®?

Voici certains des effets secondaires possibles que vous pourriez ressentir lorsque vous prenez PREVYMIS®. Si vous ressentez des effets secondaires qui ne font pas partie de cette liste, avisez votre professionnel de la santé.

Effets secondaires courants de PREVYMIS® :

- nausées
- diarrhée
- vomissements

Effets secondaires graves et mesures à prendre			
Symptôme / effet	Consultez votre professionnel de la santé		Cessez de prendre des médicaments et obtenez de l'aide médicale immédiatement
	Cas graves seulement	Dans tous les cas	
COURANT			
Leucopénie/neutropénie (faible nombre de globules blancs [cellules qui combattent les infections]) : fatigue, fièvre, endolorissements, douleurs et symptômes ressemblant à la grippe		√	

En cas de symptôme ou d'effet secondaire gênant non mentionné dans le présent document ou d'aggravation d'un symptôme ou d'effet secondaire vous empêchant de vaquer à vos occupations quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.

Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer des effets secondaires soupçonnés d'être associés à l'utilisation d'un produit à Santé Canada en :

- Visitant le site Web des déclarations des effets indésirables (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>) pour vous informer sur comment faire une déclaration en ligne, par courriel, ou par télécopieur; ou
- Téléphonant sans frais 1-866-234-2345.

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.

Entreposage :

Comprimés et solution pour injection :

- Gardez PREVMIS® dans l'emballage d'origine jusqu'à son utilisation.
- Conservez les comprimés PREVMIS® à la température ambiante (15 °C à 30 °C).
- Si vous devez conserver la solution pour injection PREVMIS® à la maison, gardez-la à la température ambiante (15 °C à 25 °C), à l'abri de la lumière.

Gardez hors de la portée et de la vue des enfants.

Pour en savoir plus sur PREVMIS® :

- Communiquer avec votre professionnel de la santé.
- Lire la monographie de produit intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les renseignements destinés aux patients. Ce document est disponible sur le site Web de Santé Canada (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html>), le site Web du fabricant (www.merck.ca), ou peut être obtenu en téléphonant au 1-800-567-2594.

Le présent dépliant a été rédigé par Merck Canada Inc.

Dernière révision : 13 mars 2024

® Merck Sharp & Dohme LLC, utilisée sous licence.

* Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© 2017, 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, É.-U. et ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.